



بیماری MF

با مایکوزیس فونگوئیدس

مرکز آموزشی و درمانی فرسهاپان
۱۳۹۳

آدرس: همدان - خیابان میرزاده عشقی، چهار راه پاستور

تلفن: ۸۰ - ۳۸۲۷۶۱۸۴ - ۸۱
فکس: ۳۸۲۶۹۸۰۸ - ۸۱

<http://fsh.umsha.ac.ir>

بیماری MF

مایکوزیس فونگوئیدس بیماری است که در آن نوع

خاصی از سلول‌های دستگاه لنفاوی (به نام لنفوسیت‌های

T) تغییر شکل داده و پوست را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

مایکوزیس فونگوئیدس معمولاً به آهستگی و در طی

سالان زیاد، شکل می‌گیرند. در مراحل ابتدایی، پوست

ممکن است دچار خارش و خشکی شده و لکه‌های

تیره‌ای روی سطح پوست نمایان شود. با وخیم تر شدن

بیماری توده‌هایی در پوست شکل می‌گیرد.

این حالت مایکوزیس فونگوئیدس نامیده می‌شود.

به تدریج که سطح وسیعتری از پوست گرفتار می‌شود

ممکن است عفونت هم اضافه گردد بیماری می‌تواند به

گرم‌های لنفاوی و یا سایر اندام‌های بدن نظیر طحال،

ریه‌ها و کبد نیز منتشر شود. هنگامی که مقدار زیادی از

سلول‌های تغییر شکل داده در خون یافت می‌شود، بیماری

تحت عنوان «سندرم سیرازی» خوانده می‌شود. در صورتی

که علایمی دال بر لنفوم جلدی در فردی د

پزشک تکهای از بافت مشکوک را برداشته و به مطالعه

آن در زیر میکروسکوپ می‌پردازد. این عمل «لکه

برداری» و یا نمونه برداری» نامیده می‌شود.

شانس بهبودی (پیش آگهی) و انتخاب نوع درمان به

مراحل استقرار بیماری (اینکه آیا بیماری محدود به پوست

برده یا به سایر نقاط بدن انتشار یافته است) و وضعیت

عمومی سلامتی بیمار بستگی دارد.

بعد از تشخیص مایکوزیس فونگوئیدس آزمایش‌های

مختلفی انجام می‌شوند تا دریابند آیا بیماری به نقاط دیگر

بدن منتشر شده‌اند یا نه. این روند «مرحله بندی» نامیده

می‌شود.

پزشک برای اتخاذ طرح درمانی باید از مرحله بیماری

آگاهی داشته باشد.