


شمار


❗ در روزهای اول بعد از عمل به دلیل تورم قرنیه، دید چشم مطلوب نیست و بدلیل برش و بخیه‌های محل عمل احساس جسم خارجی، درد مختصر و اشک‌ریزش وجو دارد که بتدریج باید رو به بهبود باشد.

❗ در صورت کاهش دید پس از بهبود نسبی آن و در صورت درد شدید در چشم و یا اطراف آن سریعاً به پزشک معالج خود، و در صورت عدم دسترسی به بیمارستان مراجعه نمایید.

❗ در روزهای اول بعد از عمل، افزایش تعداد و تماس ملاقات کنندگان و رفت و آمد بیش از حد افراد به اتاق بیمار، احتمال افزایش عفونت چشم عمل شده را در پی داشته و باید از آن پرهیز کرد.



The Correct Way to Use Eye-drops



2 Close your eye for a while **1** Gently squeeze 1-2 drops

روش ریختن قطره در چشم

❗ قطره و پماد خریداری شده با نسخه پزشک یکسان باشد. استفاده از دارو طبق دستور پزشک معالج باید انجام شود و در طول شب نیاز به چکاندن قطره نیست.

❗ قبل از مصرف قطره دست‌ها باید تمیز شسته شوند و اطراف چشم با پنبه تمیز شود. برای استفاده از قطره و پماد داخل چشمی از اطرافیان کمک بگیرید.

❗ نوک قطره و پماد نباید با دست و یا چشم تماس پیدا کند.

❗ هنگام ریختن قطره سر به عقب شده، پلک پایین را کمی به سمت پایین کشیده و یک قطره در داخل پلک بچکانید. بهتر است پس از چکاندن قطره، چشم را حدود یک دقیقه ببندید.