

درد می تواند به اشکال سوزش، تیز و فروزنده، خنجری و تیر کشنده باشد. در بعضی از بیماران درد وجود ندارد، اما خارش و حساس شدن ناحیه مبتلا دیده می شود گاهی نیز قبل از ظهور بثورات، اختلالات گوارشی و ناراحتی جسمانی ایجاد می شود ضایعات به طور گرومی بوده و پوست زیر آنها قرمز و متورم است. ضایعات در ابتدا حاوی سرم بوده و سپس محتوای چرکی می یابد که بعد پاره شده و روی آنها را ترشحات خشک شده فرا می گیرد. ناحیه ملتهب معمولاً یک طرفه بوده و به شکل نواری بر روی اعصاب سینای، گردنی یا جسمهای ظاهر می شود. تاولها به طور معمول به منطفه‌های باریک از صورت یا تنه محدود می گردند. سر بالینی این بیماری از یک تا سه هفته متغیر است. اگر یکی از اعصاب مربوط به چشم مبتلا گردد، بیمار دچار چشم درد می شود. کمترین تماس با ناحیه ملتهب و بثورات روی تنه ممکن است موجب درد شود. دوره ی بهبود بین ۷ تا ۲۶ روز است.

زونا: عفرتی است که توسط ویروس DNA دار به نام واریسلا زوستر ایجاد می شود و این ویروس به دلیل عدم امکان تشخیص آن از ویروس آبله مرغان، اینگونه نام گذاری شده است. این بیماری با ایجاد تاولهای کوچک دردناک در مسیر توزیع اعصاب حسی که از یکی یا چند گره عصبی پستی می آیند، مشخص می شود. اعتقاد بر این است که پس از طی شدن مراحل بیماری آبله مرغان، ویروس های آن در داخل سلول های عصبی نزدیک به مغز و نخاع، به حالت غیرفعال قرار می گیرند و بعدها وقتی در نتیجه کاهش ایمنی سلولی دوباره فعال می شوند از طریق اعصاب محیطی به پوست رفته، تکثیر شده و ایجاد تاول های کوچک بر از مایعی را می نمایند. در حدود ۱۰٪ بزرگسالان در زندگی خود دچار زونا می شوند، که معمولاً بعد از سن ۵۰ سالگی می باشد. تکرار این بیماری در افراد مبتلا به ضعف دستگاہ ایمنی و بیماری های بدخیم به ویژه لو کمبی و لنفوم بیشتر از بقیه است.

تظاهرات بالینی

به طور معمول قبل از ظهور بثورات یا همراه با پیدایش آنها، درد وجود دارد، که به نواحی گسترش آن صعب ممکن است انتشار داشته باشد.



زونا

مرکز آموزش و درمانی فرشمیجان

۱۳۹۳

آدرس: همدان - خیابان میرزاده عشقی، چهار راه پاستور

تلفن: ۰۸ - ۳۸۳۷۴۱۸۴

فکس: ۰۸۱ - ۳۸۳۲۹۸۰۸

<http://fsh.umsha.ac.ir>