

نداشته باشد، در حالی که سایر قسمت‌های

بدن باید پوشیده باشند.

• چنانچه پس از اشعه دچار تغییراتی مانند

خارش شدید، تغییرات رنگی غیرطبیعی،

تاول، سوختگی و ... شدید، با پزشک

مربوطه مشورت نمایید.



• از حمام گرفتن قبل از اشعه تا حد امکان

خودداری شود، چون موجب خشکی بیش

از حد پوست می‌شود.

• چنانچه پس از اشعه پوست دچار اریتم،

خارش شدید و یا تاول شده حتماً به پزشک

مربوطه اطلاع دهید.

• از قرار گرفتن در معرض اشعه مستقیم آفتاب

تا چند ساعت پس از فوتوتراپی خودداری

کنید.

• جلسات فوتوتراپی را به طور منظم انجام دهید

تا نتیجه بهتری عاید شود.

• قسمت‌هایی از بدن که دچار ضایعه می‌باشد

باید در معرض نور قرار گیرد و پوشش

۲- ویتیلگو (بیشترین تأثیر برای کسانی که ضایعات

روی صورت، گردن و تنه دارند).

۳-MF (مایکوزیس فونگوئیدس)

۴- خارش‌های شدید و مزمن با علت نامشخص

نکته:

تعیین میزان دوز درمانی توسط پزشک و با توجه به

نوع بیماری‌ها و نوع پوست تعیین می‌شود.

تکاتی که بیماران باید به آن توجه کنند:

• فوتوتراپی ممکن است باعث آسیب به چشم

شود، بنابراین در طول درمان چشم‌ها باید

توسط عینک محافظ پوشیده شوند.