

این تورمور بیشتر در ناحیه صورت دیده می‌شود.

از مشخصات آن تهاجم و فرسایش بافت‌های مجاور است. متاستاز این تورمور نادر ولی عود آن شایع است. البته نادیده گرفتن این تورمور موجب از دست رفتن بیشه گوش یا لب می‌شود.

کارسینوم سلول‌های سنگفرشی یک تکثیر بدخیم یا متاستاز است.

اگر چه معمولاً در نواحی تحت تابش آفتاب پوست بروز می‌کند ولی احتمال هم دارد از پوست سالم یا ضایعات پوستی قبلی منشاء بگیرد.

این بدخیمی نگران کننده تر از سرطان سلول‌های بازال می‌باشد زیرا واقعاً یک کارسینوم مهاجم بوده و به وسیله جریان خون یا لنف متاستاز می‌دهد.

متاستازها ۷۵٪ مرگ‌های ناشی از سرطان سلول‌های پوستی می‌باشد.

کارسینوم سلول‌های بازال سنگفرشی شایع‌ترین

سرطان‌های پوستی می‌باشد.

### تظاهرات بالینی:

کارسینوم سلول‌های بازال متداول‌ترین نوع سرطان‌های پوست است و معمولاً در نواحی تحت تابش آفتاب بدن ظاهر می‌شود و در مناطقی که افراد در معرض آفتاب قرار دارند شایعتر می‌باشد.

بروز این سرطان با سن بسیار معمولاً به طور متوسط ۶۰ سال و با میزان تماس با نور آفتاب نسبت مستقیم و با مقدار رنگدانه‌های ملانین در پوست نسبت معکوس دارد.

کارسینوم سلول‌های بازال به صورت ندول کوچک و نرم یا حاشیه گرد نیمه شفاف و صدفی رنگ بوده و ممکن است حروف آن منطقه را بزرگ و آشکار سازد و همراه با رشد تورمور در قسمت مرکزی زخم و دلخه روی آن دیده می‌شود.



کارسینوم سلول‌های بازال  
سنگفرشی و BCC

مرکز آموزشی و درمانی فم‌رشدیان  
۱۳۹۳

آدرس: همدان - خیابان میرزاده خفقی، چهار راه پاستور

تلفن: ۸ - ۲۸۳۷۴۱۸۴ - ۰۸۱

فکس: ۰۸۱ - ۲۸۳۲۹۸۰۸

<http://fsh.umsha.ac.ir>