

را محدود می کند. لذا باید به سرویس های نوتوانی ارجاع داده شوند.

جنب اعتماد و حمایت عاطفی از این بیماران از جمله اصول مهم مراقبت از این بیماران است که در این زمینه به خانواده بیمار نیز باید آموزش های لازم داده شود.



از آن جا که این بیماری زمینه خانوادگی دارد اعضای خانواده باید تشویق شوند که حداقل هر دو سال یک بار برای تشخیص زودرس گلوکوم معاینات چشم پزشکی را انجام دهند و به خصوص بعد از ۴ سالگی خود را ملزم به انجام این معاینات نمایند.

(مگر با نظر پزشک و در مواردی که درمان گلوکوم

همراه با عمل لیزرگذاری است .)

مراقبت های پرستاری :

آموزش بیماران برای مراقبت از خود :

درمان طبی و جراحی گلوکوم پیشرفت بیمار را به تاخیر می اندازد اما موجب بهبودی آن نمی شود .

از آن جا که در دارو درمان گلوکوم لازم است بیمار تا پایان عمر دارو مصرف کند آموزش بیمار اهمیت زیادی دارد .

لذا باید اهمیت مصرف داروها و نحوه استفاده از داروها و قطره های چشمی کاملاً به بیمار توضیح داده شود .
در بیماران که دچار گلوکوم شدید هستند از دست دادن دید محیطی به صورت قابل توجهی تحرک بیمار

هدف از درمان حفظ IOP در طیف نرمال است تا از وارد

آهمن آسیب بیشتر به عصب بینایی پیشگیری شود .

برای این کار در بخشی از داروهایی مانند سرم مانتیتول و داروهای ضد گلوکوم برای پایین آوردن فشار داخل چشمی استفاده می شود . در روش دیگر نیز با تاباندن اشعه لیزر به سطح داخلی ترابکولار سطح IOP پایین می آید .

از نکات مهم قبل از عمل :

چین مژه ها تزریق سرم مانتیتول طبق دستور پزشک و داروها ضد گلوکوم است .
استفاده از داروهای گشاد کننده مردمک قبل از عمل در گلوکوم ممنوع است .